

УДК 517.968

ЭФФЕКТ ЕФИМОВА В МОДЕЛИ ФРИДРИХСА

Ю. Х. Эшкабилов

Аннотация

Изучены дискретный спектр и эффект Ефимова в модели Фридрихса. Приведены необходимые и достаточные условия существования эффекта Ефимова в модели Фридрихса. Изучен также дискретный спектр одного модельного трехчастичного дискретного оператора Шредингера.

Ключевые слова: модель Фридрихса, спектр, существенный спектр, дискретный спектр, эффект Ефимова.

1. Введение

Пусть $u(x)$ — вещественнозначная непрерывная функция на $[a, b]$, K -компактный интегральный оператор в гильбертовом пространстве $L_2[a, b]$. Ряд вопросов квантовой механики и статистической физики (см. [1-3]) приводит к исследованию спектра оператора H в гильбертовом пространстве $L_2[a, b]$, действующего по формуле

$$H = U - K, \quad (1)$$

где U — оператор умножения на функцию $u(x)$, то есть $Uf(x) = u(x)f(x)$, $f \in L_2[a, b]$.

Из классической теоремы Вейля о компактном возмущении, следует что существенный спектр $\sigma_e(H)$ оператора H состоит из множества значений функции $u(x)$, т.е. $\sigma_e(H) = [u_{\min}, u_{\max}]$, где $u_{\min} = \inf_{x \in [a, b]} u(x)$, $u_{\max} = \sup_{x \in [a, b]} u(x)$.

Впервые оператор вида (1) был рассмотрен К. О. Фридрихсом [4] в качестве простой модели теории возмущений существенного спектра. Произвольный оператор вида (1) называется оператором в модели Фридрихса.

В работах Л. Д. Фаддеева [1] и О. А. Ладыженской, Л. Д. Фаддеева [5] показано что, в случае $u(x) = x$, если ядро интегрального оператора K — гильбертовское ядро с показателем $\mu > \frac{1}{2}$, то оператор $U - K$ вне существенного спектра имеет конечное число собственных значений конечной кратности.

Далее, оператор в модели Фридрихса изучен в работах [6-9]. Пусть $u(x)$ — вещественно-аналитическая функция в некоторой комплексной окрестности отрезка $[a, b]$ и ядро оператора K — симметричная и аналитическая функция в некоторой окрестности квадрата $[a, b]^2$. Доказано [6-9], что если число критических точек функции $u(x)$, т.е. тех точек в которых $u'(x) = 0$ конечно и каждая из них невырожденная, то дискретный спектр оператора H конечен.

Вопрос о бесконечности числа собственных значений в модели (1), лежащих вне существенного спектра является мало изученным, хотя с математической точки зрения в этой модели можно ожидать явление эффекта Ефимова.

В настоящей заметке рассматривается вопрос о существовании бесконечного числа собственных значений в модели Фридрихса. Найдены необходимые и достаточные условия бесконечности дискретного спектра в модели Фридрихса и как следствие полученного результата доказана теорема о дискретном спектре "трехчастичного" дискретного оператора.

2. Некоторые обозначения и необходимые сведения

Пусть $\mathcal{H}$ – гильбертово пространство, $A : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ – линейный ограниченный самосопряженный оператор. Через $\sigma(A)$, $\sigma_e(A)$ и $\sigma_d(A)$ обозначим, соответственно, спектр, существенный спектр и дискретный спектр оператора A [10]. Определим вещественное число

$$S_{\min} = S_{\min}(A) = \inf_{\|x\|=1} (Ax, x) \text{ и } S_{\max} = S_{\max}(A) = \sup_{\|x\|=1} (Ax, x)$$

Тогда $\sigma(A) \subset [S_{\min}, S_{\max}]$, при этом $S_{\min}, S_{\max} \in \sigma(A)$.

Введем также следующие обозначения

$$\mathcal{E}_{\min} = \mathcal{E}_{\min}(A) = \inf\{\lambda : \lambda \in \sigma_e(A)\},$$

$$\mathcal{E}_{\max} = \mathcal{E}_{\max}(A) = \sup\{\lambda : \lambda \in \sigma_e(A)\}.$$

Число $\mathcal{E}_{\min} \in \sigma(A)$ ($\mathcal{E}_{\max} \in \sigma(A)$) будем называть нижним краем (верхним краем) существенного спектра оператора A . Например, для компактного самосопряженного оператора $K : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ имеем $\sigma_e(K) = \{0\}$ и отсюда $\mathcal{E}_{\min}(K) = \mathcal{E}_{\max}(K) = 0$.

Предложение 2.1. (а) если $S_{\min} = \mathcal{E}_{\min}$ ($S_{\max} = \mathcal{E}_{\max}$), то у оператора A отсутствует точка дискретного спектра, лежащая ниже (выше) нижнего (верхнего) края существенного спектра, т. е. $\sigma_d(A) \cap (-\infty, \mathcal{E}_{\min}] = \emptyset$ ($\sigma_d(A) \cap [\mathcal{E}_{\max}, +\infty) = \emptyset$);

(б) если $S_{\min} < \mathcal{E}_{\min}$ ($S_{\max} > \mathcal{E}_{\max}$), то для оператора A множество точек дискретного спектра, лежащих ниже (выше) нижнего (верхнего) края существенного спектра является непустым, т. е. $\sigma_d(A) \cap (-\infty, \mathcal{E}_{\min}] \neq \emptyset$ ($\sigma_d(A) \cap [\mathcal{E}_{\max}, +\infty) \neq \emptyset$).

Для заданного ограниченного самосопряженного оператора $A : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ построим ограниченную возрастающую последовательность $\mu_n = \mu_n(A)$, $n \in \mathbb{N}$, следующим способом:

$$\mu_1(A) = S_{\min}(A) = \inf_{x \in \mathcal{H}, \|x\|=1} (Ax, x).$$

Допустим, что $\mu_1(A) = (Ax_1, x_1)$ для некоторого $x_1 \in \mathcal{H}$, $\|x_1\| = 1$.

Определим

$$\tilde{\mu}_2(A) = \mu_1(A'_1) = S_{\min}(A'_1) = \inf_{x \in {}^\perp \mathcal{H}_1, \|x\|=1} (A'_1 x, x),$$

где ${}^\perp \mathcal{H}_1 = \{x \in \mathcal{H} : (x, x_1) = 0\}$ и A'_1 – сужение оператора A на подпространство ${}^\perp \mathcal{H}_1$.

Аналогично определим

$$\tilde{\mu}_k(A) = \mu_1(A'_{k-1}) = S_{\min}(A'_{k-1}) = \inf_{x \in {}^\perp \mathcal{H}_{k-1}, \|x\|=1} (A'_{k-1} x, x),$$

где $S_{\min}(A'_k) = (A'_k x_{k+1}, x_{k+1})$, $\|x_{k+1}\| = 1$, ${}^\perp \mathcal{H}_k = \{x \in \mathcal{H} : (x, x_1) = \dots = (x, x_k) = 0\}$, A'_k – сужение оператора A на подпространство ${}^\perp \mathcal{H}_k$, $k \in \mathbb{N}$.

Теперь определим последовательность $\{\mu_n(A)\} \subset \mathbb{R}$ по правилу

$$\mu_n(A) = \sup\{\mu_1(A), \tilde{\mu}_2(A), \dots, \tilde{\mu}_n(A)\}, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (2)$$

Для заданного ограниченного самосопряженного оператора $A : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ построим ограниченную убывающую последовательность $\eta_n = \eta_n(A)$, $n \in \mathbb{N}$ следующим способом:

$$\eta_1(A) = S_{\max}(A) = \sup_{y \in \mathcal{H}, \|y\|=1} (Ay, y).$$

Допустим, что $\eta_1(A) = (Ay_1, y_1)$ для некоторого $y_1 \in \mathcal{H}$, $\|y_1\| = 1$. Определим число

$$\tilde{\eta}_2(A) = \eta_1(A''_1) = S_{\max}(A''_1) = \sup_{y \in \mathcal{H}_1^\perp, \|y\|=1} (A''_1 y, y).$$

где $\mathcal{H}_1^\perp = \{y \in \mathcal{H} : (y, y_1) = 0\}$ и A''_1 – сужение оператора A на подпространство $\mathcal{H}_1^\perp$.

Аналогично определим

$$\tilde{\eta}_k(A) = \eta_1(A''_{k-1}) = S_{\max}(A''_{k-1}) = \sup_{y \in \mathcal{H}_{k-1}^\perp, \|y\|=1} (A''_{k-1} y, y),$$

где $S_{\max}(A''_k) = (A''_{k+1} y_{k+1}, y_{k+1})$, $\|y_{k+1}\| = 1$, $\mathcal{H}_k^\perp = \{y \in \mathcal{H} : (y, y_1) = \dots = (y, y_k) = 0\}$, A''_k – сужение оператора A на подпространство $\mathcal{H}_k^\perp$, $k \in \mathbb{N}$.

Определим последовательность $\{\eta_n(A)\} \subset \mathbb{R}$ по правилу

$$\eta_n(A) = \inf\{\eta_1(A), \tilde{\eta}_2(A), \dots, \tilde{\eta}_n(A)\}, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (3)$$

В книге [11] пользуясь методом принципа минимакса изучен дискретный спектр заданного самосопряженного и ограниченного снизу оператора действующего в гильбертовом пространстве. В частности, доказано существование собственных значений лежащих ниже существенного спектра и бесконечность дискретного спектра для некоторых многочастичных гамильтонианов.

Надо подчеркнуть, что для самосопряженных и ограниченных снизу операторов существенный спектр $\sigma_e(\cdot)$ по построению имеет удобный вид, т.е. он представляется только одним бесконечным отрезком $[a, \infty)$. Для таких операторов дискретный спектр лежит только в одном полуинтервале, т.е. существует число $c < a$ такое, что $\sigma_d(\cdot) \subset [c, a)$. Поэтому принцип минимакса для таких операторов успешно применяется [11].

Существенный спектр ограниченного самосопряженного оператора может состоять из нескольких отрезков, между этими отрезками могут существовать точки дискретного спектра. Например, если для заданного ограниченного самосопряженного оператора A $\sigma_e(A) = \bigcup_k [a_k, b_k]$, где $b_k < a_{k+1}$, то $\sigma_d(A) \subset [\mu_1(A), \mathcal{E}_{\min}) \cup (\bigcup_k (b_k, a_{k+1})) \cup (\mathcal{E}_{\max}, \eta_1(A)]$, где $\mathcal{E}_{\min} = \inf\{a_1, a_2, \dots\}$, $\mathcal{E}_{\max} = \sup\{b_1, b_2, \dots\}$. Принцип минимакса и максимина нам позволяет изучать дискретные спектры самосопряженных ограниченных операторов лежащих ниже нижнего края существенного спектра $\mathcal{E}_{\min}$ и лежащих выше верхнего края существенного спектра $\mathcal{E}_{\max}$.

Теорема 2.2 (принцип минимакса для ограниченных операторов в операторной форме). Пусть $A : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ – ограниченный самосопряженный оператор. Тогда для каждого фиксированного $n \in \mathbb{N}$:

либо

а) существует n собственных значений (считая вырожденные собственные значения столько раз, какова их кратность), лежащие ниже нижнего края $\mathcal{E}_{\min}(A)$ существенного спектра, а $\mu_n(A)$ (2) есть n -е собственное значение оператора A (с

учетом кратности),

либо

б) $\mu_n(A)$ – нижний край существенного спектра, т. е. $\mu_n(A) = \mathcal{E}_{\min}(A)$, при этом $\mu_n = \mu_{n+1} = \mu_{n+2} = \dots$ и существует самое большее $n - 1$ собственных значений (с учетом кратности), лежащих ниже нижнего края $\mathcal{E}_{\min}(A)$ существенного спектра оператора A .

Доказательство проводится аналогично доказательству теоремы о принципе минимакса для операторов ограниченных снизу [11].

Теорема о принципе максимина для ограниченных операторов формулируется следующим образом.

Теорема 2.3 (принцип максимина для ограниченных операторов в операторной форме). Пусть $A : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ – ограниченный самосопряженный оператор. Тогда для каждого фиксированного $n \in \mathbb{N}$:

либо

а) существует n собственных значений (считая вырожденные собственные значения столько раз, какова их кратность), лежащие выше верхнего края $\mathcal{E}_{\max}(A)$ существенного спектра, а $\eta_n(A)$ (3) есть n -е собственное значение оператора A (с учетом кратности),

либо

б) $\eta_n(A)$ – верхний край существенного спектра, т. е. $\eta_n(A) = \mathcal{E}_{\max}(A)$, при этом $\eta_n = \eta_{n+1} = \eta_{n+2} = \dots$ и существует самое большее $n - 1$ собственных значений (с учетом кратности), лежащих выше верхнего края $\mathcal{E}_{\max}(A)$ существенного спектра оператора A .

Линейный ограниченный оператор $A : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ называется положительным и пишется $A \geq 0$ или $0 \leq A$, если $(Ax, x) \geq 0, \forall x \in \mathcal{H}$.

Следствие 2.4. Пусть $A, B : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ – линейные ограниченные самосопряженные операторы и $A \leq B$. Тогда

$$(a) \text{ Если } \mathcal{E}_{\min}(A) = \mathcal{E}_{\min}(B), \text{ то } \mu_n(A) \leq \mu_n(B), n \in \mathbb{N} \quad (4)$$

$$(b) \text{ Если } \mathcal{E}_{\max}(A) = \mathcal{E}_{\max}(B), \text{ то } \eta_n(A) \leq \eta_n(B), n \in \mathbb{N} \quad (5)$$

Будем говорить, что точка $\lambda \in \sigma_e(A)$ изолирована слева (справа) на существенном спектре оператора A , если существует число $\delta > 0$ такое, что $(\lambda - \delta, \lambda] \cap \sigma_e(A) = \{\lambda\}$ ($[\lambda, \lambda + \delta) \cap \sigma_e(A) = \{\lambda\}$).

Определение 2.1. Пусть точка $\lambda \in \sigma_e(A)$ изолирована слева на существенном спектре оператора A . Если существует последовательность $\{\lambda_n\}$ собственных значений оператора A , удовлетворяющая условиям $\lambda_n < \lambda$ для всех $n \in \mathbb{N}$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \lambda$, то говорят, что в точке λ слева существует эффект Ефимова.

Определение 2.2. Пусть точка $\lambda \in \sigma_e(A)$ изолирована справа на существенном спектре оператора A . Если существует последовательность $\{\lambda_n\}$ собственных значений оператора A , удовлетворяющая условиям $\lambda_n > \lambda$ для всех $n \in \mathbb{N}$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \lambda$, то говорят, что в точке λ справа существует эффект Ефимова.

3. Модель Фридрикса

Пусть $u(t)$ — неотрицательная непрерывная функция на $[0, 1]$ и $u^{-1}(\{0\}) \cap [0, 1] \neq \emptyset$; $k(t, s) \in L_2[0, 1]^2$ и $k(t, s) = \overline{k(s, t)}$. В пространстве $L_2[0, 1]^2$ рассмотрим самосопряженный оператор

$$H = U - K, \quad (6)$$

где

$$(Uf)(t) = u(t)f(t), \quad f \in L_2[0, 1]$$

$$(Kf)(t) = \int_0^1 k(t, s)f(s)d\mu(s), \quad f \in L_2[0, 1].$$

Из теоремы Вейля [11] о компактном возмущении существенного спектра получаем, что $\sigma_e(H) = \sigma(U) = [0, u_{\max}]$ и отсюда $\mathcal{E}_{\min}(H) = 0, \mathcal{E}_{\max}(H) = u_{\max}$.

Теорема 3.1. *Если интегральный оператор K в модели (6) имеет конечное число положительных (отрицательных) собственных значений, то оператор $U - K$ также имеет конечное число собственных значений лежащих ниже (выше) существенного спектра.*

Доказательство а) Пусть оператор K имеет только $n - 1$ число положительных собственных значений. Тогда оператор $-K$ также имеет ровно $n - 1$ отрицательных собственных значений. Имеем $U \geq 0$. Тогда из $\mathcal{E}_{\min}(-K) = \mathcal{E}_{\min}(U - K)$ в силу неравенства (4) получаем, что $\mu_k(-K) \leq \mu_k(U - K), \forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$. В силу принципа минимакса $\mu_n(-K) = \mu_{n+1}(-K) = \dots = 0$. Следовательно, оператор $U - K$ ниже существенного спектра имеет не больше $n - 1$ собственных значений.

б) Пусть оператор K имеет только $n - 1$ отрицательных собственных значений. Тогда оператор $u_{\max} \cdot E - K$ также имеет только $n - 1$ собственных значений лежащих выше числа $u_{\max}$, где E — тождественный оператор в $L_2[0, 1]$. Имеем $\mathcal{E}_{\max}(U - K) = \mathcal{E}_{\max}(u_{\max}E - K)$. Тогда из соотношений $u_{\max}E - U \geq 0$ получаем, что

$$\eta_k(U - K) \leq \eta_k(u_{\max}E - K), \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Однако в силу принципа максимина имеем $u_{\max} = \eta_n(u_{\max}E - K) = \eta_{n+1}(u_{\max}E - K) = \dots$. Отсюда $\eta_{n+k}(U - K) = u_{\max}, k = 0, 1, \dots$, т.е. оператор $U - K$ имеет не более $n - 1$ собственных значений, лежащих выше существенного спектра. ■

Следствие 3.2. *Чтобы у оператора $U - K$ ниже (выше) существенного спектра существовал эффект Ефимова необходимо, чтобы компактный оператор K имел бесконечное число положительных (отрицательных) собственных значений.*

Теорема 3.3. (а) *Чтобы у оператора $U - K$ ниже существенного спектра существовал эффект Ефимова необходимо, чтобы*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 u(t)|\varphi_n(t)|^2 d\mu(t) = 0,$$

где $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — система ортонормированных собственных функций соответствующих собственным значениям оператора $U - K$ лежащих ниже существенного спектра;

(б) *Чтобы у оператора $U - K$ выше существенного спектра существовал эффект Ефимова необходимо, чтобы*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 u(t)|\psi_n(t)|^2 d\mu(t) = u_{\max},$$

где $\{\psi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — система ортонормированных собственных функций соответствующих собственным значениям оператора $U - K$ лежащих выше существенного спектра.

Доказательство. а) Пусть для оператора $U - K$ в точке $\lambda = 0$ слева существует эффект Ефимова. Тогда существует последовательность отрицательных собственных значений оператора $U - K$, т.е. $\mu_n(U - K) < 0, \forall n \in \mathbb{N}$. Пусть $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — система ортонормированных собственных функций соответствующих собственным значениям $\mu_n(U - K), n \in \mathbb{N}$. Имеем $(U\varphi_n, \varphi_n) - (K\varphi_n, \varphi_n) = \mu_n(U - K) < 0, n \in \mathbb{N}$. Отсюда получаем, что $0 \leq (U\varphi_n, \varphi_n) < (K\varphi_n, \varphi_n), n \in \mathbb{N}$. В силу компактности оператора K имеем $\lim_{n \rightarrow \infty} (K\varphi_n, \varphi_n) = 0$. Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} (U\varphi_n, \varphi_n) = 0$, т.е.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 u(t) |\varphi_n(t)|^2 d\mu(t) = 0.$$

б) Пусть для оператора $U - K$ в точке $\lambda = u_{\max}$ справа существует эффект Ефимова. Тогда существует последовательность λ_n собственных значений оператора $U - K$, удовлетворяющая неравенству $\lambda_n > u_{\max}, \forall n \in \mathbb{N}$, т.е. $\eta_n(U - K) > u_{\max}$. Пусть $\{\psi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — система ортонормированных собственных функций соответствующих собственным значениям $\eta_n(U - K), n \in \mathbb{N}$. Тогда имеем $(U\psi_n, \psi_n) - (K\psi_n, \psi_n) = \eta_n(U - K) > u_{\max}, n \in \mathbb{N}$. Отсюда $u_{\max} + (K\psi_n, \psi_n) < (U\psi_n, \psi_n) \leq u_{\max}, n \in \mathbb{N}$. Следовательно,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (U\psi_n, \psi_n) = \int_0^1 u(t) |\psi_n(t)|^2 d\mu(t) = u_{\max}. \quad \blacksquare$$

Теорема 3.4. Если существует ортонормированная система $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L_2[0, 1]$ удовлетворяющая условию

$$\int_0^1 u(t) |f_k(t)|^2 d\mu(t) < c_k, \forall k \in \mathbb{N}, \quad (7)$$

где $c_k = (Kf_k, f_k)$, тогда слева от точки $\lambda = 0$ спектра оператора $U - K$ существует эффект Ефимова.

Доказательство. Пусть в пространстве $L_2[0, 1]$ существует ортонормированная система $\{f_n\}, n \in \mathbb{N}$ удовлетворяющая условию (7). Предположим, что система $\{f_n\}, n \in \mathbb{N}$ упорядочена в следующем смысле: $(Hf_k, f_k) \leq (Hf_{k+1}, f_{k+1}), k \in \mathbb{N}$. Имеем

$$S_{\min}(H) = \mu_1(H) \leq (Hf_1, f_1) < 0,$$

т.е. существует $\varphi_1 \in L_2[0, 1], \|\varphi_1\| = 1$ такая, что $\mu_1(H) = (H\varphi_1, \varphi_1) < 0$ и по теореме о принципе минимакса $\mu_1(H)$ является собственным значением оператора $H = U - K$. Для каждого $k \in \mathbb{N}$ определим подпространство ${}^\perp L_2^{(k)}[0, 1]$:

$${}^\perp L_2^{(k)}[0, 1] = \{f \in L_2[0, 1] : (f, f_j) = 0, j = 1, 2, \dots, k\}.$$

Пусть H_k сужение оператора H на подпространство ${}^\perp L_2^{(k)}[0, 1], k \in \mathbb{N}$. Для оператора H_1 имеем

$$\begin{aligned} \mu_1(H_1) = S_{\min}(H_1) &= \inf_{f \in {}^\perp L_2^{(1)}[0, 1], \|f\|=1} (H_1 f, f) \leq \\ &\leq (H_1 f_2, f_2) = (H f_2, f_2) < 0 \end{aligned}$$

Так как $f_2 \in {}^\perp L_2^{(1)}[0, 1]$, $\|f_2\| = 1$, то существует $\varphi_2 \in {}^\perp L_2^{(1)}[0, 1]$, $\|\varphi_2\| = 1$ такая, что $\mu_1(H_1) = (H_1\varphi_2, \varphi_2) = (H\varphi_2, \varphi_2) < 0$. Для каждого $k \geq 2$ повторяя аналогичное рассуждение имеем

$$\begin{aligned}\mu_1(H_k) = S_{\min}(H_k) &= \inf_{f \in {}^\perp L_2^{(k)}[0, 1], \|f\|=1} (H_k f, f) \leq \\ &\leq (H_k f_{k+1}, f_{k+1}) = (H f_{k+1}, f_{k+1}).\end{aligned}$$

Так как $f_{k+1} \in {}^\perp L_2^{(k)}[0, 1]$, $\|f_{k+1}\| = 1$, $k \geq 2$, то существует $\varphi_{k+1} \in {}^\perp L_2^{(k)}[0, 1]$, $\|\varphi_{k+1}\| = 1$ такая, что $\mu_1(H_k) = (H_k \varphi_{k+1}, \varphi_{k+1}) = (H \varphi_{k+1}, \varphi_{k+1}) < 0$, где $k \geq 2$. Таким образом, для каждого $k \in \mathbb{N}$ оператор сужения H_k имеет собственное значение $\mu_1(H_k) < 0$ и $\mu_1(H_k) \leq \mu_1(H_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$. Следовательно, каждое число $\omega_k = \mu_1(H_k) < 0$, $k = 0, 1, 2, \dots$ является собственным значением оператора H , где $H_0 = H$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} \omega_n = 0$. ■

Теорема 3.5. *Если существует ортонормированная система $\{f_n\} \subset L_2[0, 1]$ удовлетворяющая условию*

$$\int_0^1 u(t) |f_k(t)|^2 d\mu(t) > c_k + u_{\max}, \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad (8)$$

где $c_k = (K f_k, f_k)$, тогда справа от точки $\lambda = u_{\max}$ спектра оператора $U - K$ существует эффект Ефимова.

Замечание 3.6. *Если в модели Фридрихса (6) функция $u(t)$ не удовлетворяет условию $u^{-1}(\{0\}) \cap [0, 1] \neq \emptyset$, то сдвигая оператор H на $-u_{\min}$ имеем оператор $\tilde{H} = \tilde{U} - K$ в модели Фридрихса, где $(\tilde{U} f)(t) = (u(t) - u_{\min})f(t)$, $f \in L_2[0, 1]$ и функция $h(t) = u(t) - u_{\min}$ удовлетворяет условию $h(t) \geq 0$, $t \in [0, 1]$ и $h^{-1}(\{0\}) \cap [0, 1] \neq \emptyset$. Следовательно, получая информацию о спектре оператора $\tilde{H}$ мы получаем полную информацию о спектре оператора H , так как: если $\tilde{\omega}$ является m -кратным собственным значением оператора $\tilde{H}$, то число $\tilde{\omega} + u_{\min}$ является m -кратным собственным значением оператора H и наоборот, при этом $\sigma_e(H) = [u_{\min}, u_{\max}]$.*

4. "Трехчастичный" оператор Шредингера T

Одним из замечательных результатов в спектральной теории многочастичных гамильтонианов является эффект Ефимова. Этот эффект для трехчастичных гамильтонианов впервые был обнаружен в 1970 году В.Н. Ефимовым [12]. С тех пор эта задача изучалась во многих работах (см., например, [13-18]). В работах [19-22] изучен эффект Ефимова для трехчастичного дискретного оператора Шредингера. В этом параграфе мы рассмотрим модель трехчастичного дискретного оператора T и изучим условия существования эффекта Ефимова.

Пусть T ограниченный самосопряженный оператор в $L_2[0, 1]^2$ заданный по правилу

$$T = T_0 - (T_1 + T_2), \quad (9)$$

где

$$\begin{aligned}(T_0 f)(x, y) &= (u(x) + v(y))f(x, y), \quad f \in L_2[0, 1]^2 \\ (T_1 f)(x, y) &= \int_0^1 \int_0^1 k_1(x, s) \delta(y - t) f(s, t) d\mu(s) d\mu(t), \quad f \in L_2[0, 1]^2\end{aligned}$$

$$(T_2 f)(x, y) = \int_0^1 \int_0^1 k_2(y, t) \delta(x - s) f(s, t) d\mu(s) d\mu(t), \quad f \in L_2[0, 1]^2$$

Здесь $u(x), v(x)$ — заданные неотрицательные непрерывные функции на $[0, 1]$ и $u^{-1}(\{0\}) \cap [0, 1] \neq \emptyset, v^{-1}(\{0\}) \cap [0, 1] \neq \emptyset$; $k_1(x, s), k_2(x, s)$ — заданные непрерывные функции на квадрате $[0, 1]^2$ и $k_1(x, s) = \overline{k_1(s, x)}, k_2(x, s) = \overline{k_2(s, x)}, \delta(x)$ — дельта функция Дирака на $[0, 1]$.

Операторы T_1 и T_2 не являются компактными. Существенный спектр оператора в модели (9) в более общем случае изучен в работе автора [23]. В модели Хаббарда [23] возникает "трехчастичный" дискретный оператор, который представляется в виде (9). Оператор T (9) является общим аналогом трехчастичного дискретного оператора, соответствующего системе состоящей из двух свободных электронов и одной примеси на решетке, и его в дальнейшем будем называть "трехчастичным" дискретным оператором Шредингера.

Замечание 4.1. Оператор T (9) можно представить, как оператора в модели Фридрихса с некомпактным ядром, т.е. $T = T_0 - W$, где W интегральный оператор в $L_2[0, 1]^2$ с некомпактным ядром $q(x, y; s, t) = k_1(x, s)\delta(y - t) + k_2(y, t)\delta(x - s)$.

Наряду с гамильтонианом T мы будем рассматривать два оператора H_1 и H_2 в пространстве $L_2[0, 1]$, каждый из которых представляется в модели Фридрихса в следующем виде:

$$H_1 = U_1 - K_1, \quad (10)$$

где

$$(U_1 \varphi)(x) = u(x) \varphi(x), \quad \varphi \in L_2[0, 1],$$

$$(K_1 \varphi)(x) = \int_0^1 k_1(x, s) \varphi(s) d\mu(s), \quad \varphi \in L_2[0, 1]$$

и

$$H_2 = U_2 - K_2, \quad (11)$$

где

$$(U_2 \varphi)(x) = v(x) \varphi(x), \quad \varphi \in L_2[0, 1],$$

$$(K_2 \varphi)(x) = \int_0^1 k_2(x, s) \varphi(s) d\mu(s), \quad \varphi \in L_2[0, 1].$$

В дальнейшем мы предположим, что ядра $k_1(x, s)$ и $k_2(x, s)$ в модели (9) удовлетворяют условиям $K_1 \geq 0$ и $K_2 \geq 0$, т.е. K_1, K_2 — положительные операторы.

Обозначим через $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k, \dots$ отрицательные собственные значения оператора H_1 , через ρ_1 обозначим их количество и предположим, что $\alpha_k \leq \alpha_{k+1}$. Тогда имеем $\sigma_d(H_1) = \{\alpha_k\}_{k=1}^{\rho_1}$. Аналогично, через $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k, \dots$ обозначим отрицательное собственное значение оператора H_2 , через ρ_2 их количество и предположим, что $\beta_k \leq \beta_{k+1}$. Тогда $\sigma_d(H_2) = \{\beta_k\}_{k=1}^{\rho_2}$.

Пользуясь тензорным произведением пространств и операторов [10], гамильтониан T мы можем представить в виде $T = H_1 \otimes E + E \otimes H_2$. Для спектра оператора T имеем [10]: $\sigma(T) = \sigma(T_1) + \sigma(T_2)$. Отсюда следует [23]:

Теорема 4.1. а) $\sigma_e(T) = \sigma_0 \cup \sigma_1 \cup \sigma_2$, где $\sigma_0 = [0, u_{\max} + v_{\max}]$, $u_{\max} = \sup u(x)$, $v_{\max} = \sup v(x)$ и

$$\sigma_1 = \overline{\bigcup_{k=1}^{\rho_1} [\alpha_k, v_{\max} + \alpha_k]}, \quad \sigma_2 = \overline{\bigcup_{k=1}^{\rho_2} [\beta_k, u_{\max} + \beta_k]}.$$

б) $\sigma_d(T) = \{\omega : \omega = \alpha + \beta \notin \sigma_1 \cup \sigma_2, \alpha \in \sigma_d(H_1), \beta \in \sigma_d(H_2)\}$.

Легко проверить, что $\sigma(T) \subset [\alpha_1 + \beta_1, u_{\max} + v_{\max}]$, при этом $\alpha_1 + \beta_1 \in \sigma_d(T)$.

Следствие 4.2. *Существенный спектр гамильтониана T состоит из объединения конечного числа отрезков.*

Доказательство. Если дискретный спектр операторов H_1 и H_2 конечен (**случай 1**), то из утверждения (а) теоремы 4.1. следует, что $\sigma_e(T)$ состоит из объединения конечного числа отрезков.

Случай 2: Допустим, что $\sigma_d(H_1)$ — бесконечен и $\sigma_d(H_2)$ — конечен. Тогда для возрастающей последовательности $\alpha_n, n \in \mathbb{N}$ имеем $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$. Следовательно, существует натуральное число $n_0 = n_0(H_1)$ удовлетворяющее условию: $\alpha_{n+1} - \alpha_n < v_{\max}, \forall n \geq n_0$.

Для натурального числа $n_0 = n_0(H_1)$ имеем

$$\bigcup_{k=n_0}^{\infty} [\alpha_k, v_{\max} + \alpha_k] = [\alpha_{n_0}, v_{\max}].$$

Следовательно,

$$\sigma_1 = \bigcup_{k=1}^{n_0-1} [\alpha_k, v_{\max} + \alpha_k] \bigcup [\alpha_{n_0}, v_{\max}],$$

т.е. σ_1 состоит из объединения конечного числа отрезков, а множество σ_2 по предположению обладает этим свойством. Значит $\sigma_e(T)$ представляется в виде объединения конечного числа отрезков.

Случай 3: $\sigma_d(H_1)$ — конечен и $\sigma_d(H_2)$ — бесконечен. Тогда опять, как в случае 2 существует натуральное число $m_0 = m_0(H_2)$ такое, что $\beta_{n+1} - \beta_n < u_{\max}, \forall n \geq m_0$.

Следовательно, имеем

$$\sigma_2 = \bigcup_{k=1}^{m_0-1} [\beta_k, u_{\max} + \beta_k] \bigcup [\beta_{m_0}, u_{\max}].$$

Случай 4: $\sigma_d(H_1)$ и $\sigma_d(H_2)$ — бесконечны. Тогда определяя натуральные числа $n_0 = n_0(H_1)$ и $m_0 = m_0(H_2)$, как в предыдущих случаях, мы будем множество $\sigma_e(T)$ представлять в виде объединения конечного числа отрезков. ■

Следствие 4.3. *Всякая изолированная точка в спектре оператора T является конечнократным собственным значением.*

Следствие 4.4.

- (а) если $\sigma_d(H_1) = \emptyset$ или $\sigma_d(H_2) = \emptyset$, то $\sigma_d(T) = \emptyset$;
- б) если $|\sigma_d(H_1)| > 0$ и $|\sigma_d(H_2)| > 0$, то $|\sigma_d(T)| > 0$, где $|\Omega|$ — мощность множества Ω .
- в) если $|\sigma_d(H_1)| = p$ и $|\sigma_d(H_2)| = q$, то $|\sigma_d(T)| \leq pq$.

Обозначим через $n_e(T)$ количество взаимно непересекающихся отрезков, объединением которых является множество $\sigma_e(T)$. Таким образом существенный спектр $\sigma_e(T)$ представляется в виде

$$\sigma_e(T) = \bigcup_{k=1}^{n_e(T)} [S_k, S'_k], \quad S_k < S'_k < S_{k+1}. \quad (12)$$

Нетрудно проверить, что в (12) $S_1 = \min\{\alpha_1, \beta_1\}$, при $|\sigma_d(H_1)| > 0$ и $|\sigma_d(H_2)| > 0$.

Теорема 4.5. Пусть $0 < |\sigma_d(H_1)| = p$ и $|\sigma_d(H_2)| = \infty$. Если для $\alpha \in \sigma_d(H_1)$ найдется число $S_k \in \{S_1, S_2, \dots, S_{n_e(T)}\}$ равное числу α , тогда в точке $\xi_k \in \sigma(T)$ существует эффект Ефимова.

Доказательство. Допустим, что для $\alpha \in \sigma_d(H_1)$ существует $S_k \in \{S_1, S_2, \dots, S_{n_e(T)}\}$ такое, что $S_k = \alpha$. Тогда из представления (12) существенного спектра существует $\delta > 0$ такое, что $(\alpha - \delta, \alpha] \cap \sigma_e(T) = \{\alpha\}$. С другой стороны, имеем $\omega_n = \alpha + \beta_n \in \sigma_p(T)$, $\forall n \in \mathbb{N}$ и $\omega_n < \alpha$, $\forall n \in \mathbb{N}$, где $\sigma_p(T)$ — множество собственных значений оператора T . Поскольку $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = 0$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \omega_n = \xi_k$. Тогда в точке $\xi_k \in \sigma_e(T)$ слева существует эффект Ефимова. ■

Замечание 4.2. Пусть $0 < |\sigma_d(H_1)| = p$ и $|\sigma_d(H_2)| = \infty$.

а) Тогда может быть, что в модели (9) отсутствует эффект Ефимова. Например, в случае $\sigma_e(H_1) = \sigma_e(H_2) = [0, 1]$, $\sigma_d(H_1) = \{-1\}$ и $\sigma_d(H_2) = \{-\frac{2}{n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ имеем $\sigma_0 = [0, 2]$, $\sigma_1 = [-1, 0]$, $\sigma_2 = [-2, 0] \cup B$, где $B \subset [-\frac{2}{3}, 1]$. Следовательно, $\sigma_e(T) = [-2, 2]$ и $\sigma_d(T) = \{-3\}$.

б) В модели (9) эффект Ефимова появиться не больше чем в p точках.

Теорема 4.6. Пусть $|\sigma_d(H_1)| = \infty$ и $0 < |\sigma_d(H_2)| = q$. Если для $\beta \in \sigma_d(H_2)$ найдется $S_k \in \{S_1, S_2, \dots, S_{n_e(T)}\}$ равное числу β , тогда в точке $\xi_k \in \sigma(T)$ существует эффект Ефимова.

Теорема 4.7. Пусть $|\sigma_d(H_1)| = |\sigma_d(H_2)| = \infty$. Тогда в каждой точке $S_k \in \{S_1, S_2, \dots, S_{n_e(T)}\}$ существует эффект Ефимова.

Доказательство. Допустим, что $|\sigma_d(H_1)| = |\sigma_d(H_2)| = \infty$. Из представления (12) существенного спектра $\sigma_e(T)$ получаем, что эффект Ефимова может существовать в точках $S_k, k \in \{1, 2, \dots, n_e(T)\}$. С другой стороны, для каждого ξ_k найдется номер j_k такая, что $\xi_k = \alpha(j_k)$ или $\xi_k = \beta(j_k)$. Пусть имеет место равенство $\xi_k = \alpha(j_k)$. Очевидно, что $\omega_n = \alpha(j_k) + \beta_n \in \sigma_p(T)$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Имеем $\omega_n < \alpha(j_k)$, $\forall n \in \mathbb{N}$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} \omega_n = \alpha(j_k) = \xi_k$. Значит в точке $\xi_k \in \sigma(T)$ слева существует эффект Ефимова. Аналогично рассматривается случай $\xi_k = \beta(j_k)$. ■

Замечание 4.3. Пусть $|\sigma_d(H_1)| = |\sigma_d(H_2)| = \infty$. Тогда возможно, что в модели (9) существует эффект Ефимова только в единственной точке $\omega_0 = \min\{\alpha_1, \beta_1\}$, т.е. $n_e(T) = 1$. Например, в случае $\sigma_e(H_1) = \sigma_e(H_2) = [0, 1]$, $\sigma_d(H_1) = \{-\frac{4}{n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ и $\sigma_d(H_2) = \{-\frac{5}{n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ имеем $\sigma_0 = [0, 2]$, $\sigma_1 = [-4, 1]$ и $\sigma_2 = [-5, 1]$. Следовательно, получаем, что $\sigma_e(T) = [-5, 2]$, $\sigma_d(T) \subset [-9, -5]$ и $\omega_n = -5 - \frac{4}{n} \in \sigma_d(T)$, $n \in \mathbb{N}$.

5. Примеры

Изучим дискретный спектр и эффект Ефимова в модели Фридрихса в конкретных примерах.

Случай 1: $|\sigma_p(U)| = \infty$, где $\sigma_p(U)$ – множество собственных значений оператора U . Рассмотрим последовательность $r_n(x)$ непрерывных функций на $[0, 1]$ заданных по формуле

$$r_n(x) = \begin{cases} \frac{3}{h_k}(x - p_k), & \text{если } x \in [p_k, p_k + \frac{h_k}{3}) \\ 1, & \text{если } x \in [p_k + \frac{h_k}{3}, p_{k+1} - \frac{h_k}{3}) \\ -\frac{3}{h_k}(x - p_{k+1}), & \text{если } x \in [p_{k+1} - \frac{h_k}{3}, p_{k+1}] \\ 0, & \text{если } x \notin [p_k, p_{k+1}] \end{cases}$$

где $p_1 = 0$, $p_2 = \frac{1}{2}$, $p_{n+1} = p_n + \frac{1}{2^n}$, $n \in \mathbb{N}$, $h_k = \frac{1}{2^k}$, $k \in \mathbb{N}$.

Пусть функция потенциала $u(x)$ в модели (6) задана по формуле

$$u(x) = \sum_{k \in \mathbb{N}} a_k r_k(x), \quad (13)$$

где $a_n > 0$, $n \in \mathbb{N}$ и $a_1 = 1$, $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n < \infty$.

Ряд (13) равномерно сходится на отрезке $[0, 1]$. Следовательно, каждая функция $u(x)$, заданная по формуле (13), является неотрицательной и непрерывной на $[0, 1]$, при этом $u_{\min} = 0$, $u_{\max} = 1$.

Предположим, что ядро $k(x, s)$ интегрального оператора $K : L_2[0, 1] \rightarrow L_2[0, 1]$ задано равенством

$$k(x, s) = \sum_{k \in \mathbb{N}} \lambda_n \varphi_n(x) \varphi_n(s), \quad (14)$$

где

$$\varphi_n(x) = \frac{3}{\sqrt{h_n}} q_n(x), \quad (15)$$

$$q_n(x) = \begin{cases} \frac{6}{h_n}(x - p_n - \frac{h_n}{3}), & \text{если } x \in [p_n + \frac{h_n}{3}, p_n + \frac{h_n}{2}] \\ -\frac{6}{h_n}(x - p_{n+1} + \frac{h_n}{3}), & \text{если } x \in (p_n + \frac{h_n}{2}, p_{n+1} - \frac{h_n}{3}] \\ 0, & \text{если } x \notin [p_n + \frac{h_n}{3}, p_{n+1} - \frac{h_n}{3}] \end{cases},$$

Здесь последовательность λ_n удовлетворяет условиям $\lambda_n > 0$, $n \in \mathbb{N}$ и $\sum_{k \in \mathbb{N}} 2^k \lambda_k < \infty$. Например, $\lambda_n = \frac{1}{3^n}$ (или $\lambda_n = \frac{1}{a^n}$, $a > 2$).

Последовательность непрерывных функций $\varphi_n(x)$ (15) является ортонормированной в $L_2[0, 1]$. Ряд (14) равномерно сходится на квадрате $[0, 1] \times [0, 1]$. Интегральный оператор K , заданный ядром $k(x, s)$ (14) является самосопряженным и положительным в $L_2[0, 1]$.

Допустим, что для некоторого натурального n_0 выполняется условие $a_n < \lambda_n$, $\forall n \geq n_0$. Тогда в модели Фридрихса ниже существенного спектра существует эффект Ефимова, так как

$$(H\varphi_n)(x) = (U\varphi_n)(x) - (K\varphi_n)(x) = (a_n - \lambda_n)\varphi_n(x), \quad n \in \mathbb{N},$$

т.е. $\omega_{p_0}, \omega_{p_0+1}, \dots, \omega_{p_0+k}, \dots$ являются отрицательными собственными значениями оператора $U - K$, где $\omega_n = a_n - \lambda_n$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} \omega_{p_0+k} = 0$. (Например, в случае $a_n = \frac{1}{5^{n-1}}$, $n \in \mathbb{N}$ и $\lambda_n = \frac{1}{3^n}$, $n \in \mathbb{N}$ числа ω_1, ω_2 и ω_3 являются положительными собственными значениями оператора $H = U - K$, а числа $\omega_4, \omega_5, \dots, \omega_n, \dots$ являются

отрицательными собственными значениям оператора $U - K$, где $\omega_n = a_n - \lambda_n$ т.е. $\sigma_d(H - K) = \{\omega_k\}_{k=4}^\infty$.

Случай 2: $|\sigma_p(U)| = 0$. Пусть $u(x)$ — произвольная убывающая непрерывная неотрицательная функция на $[0, 1]$, которая удовлетворяет условию $u^{-1}(\{0\}) \cap [0, 1] \neq \emptyset$. Положим

$$q_n = q_n(u) = \sup_{x \in [p_n, p_{n+1}]} u(x), \quad n \in \mathbb{N},$$

где последовательность p_k определена в примере 1. Тогда $q_n \geq q_{n+1}$, $n \in \mathbb{N}$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = 0$. Если $\{q_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in l_2$, тогда всегда найдется ядро $k(x, s)$, при котором в модели Фридрихса существует эффект Ефимова, так как в пространстве $L_2[0, 1]$ мы можем взять последовательность ортонормированных функций

$$\nu_n(x) = 2^{\frac{n+1}{2}} \sin \xi_n(x),$$

где

$$\xi_k(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{p_{k+1} - p_k}(x - p_k), & \text{если } x \in [p_k, p_{k+1}] \\ 0, & \text{если } x \notin [p_k, p_{k+1}] \end{cases}$$

и ядро $k(x, s)$, заданное по формуле

$$k(x, s) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \lambda_n \nu_n(x) \nu_n(s),$$

где $\lambda_n > 0, n \in \mathbb{N}, \sum_{n \in \mathbb{N}} \lambda_n^2 < \infty$ и для некоторого $n_0 \in \mathbb{N}$ при этом выполняется неравенство

$$q_n < \lambda_n, \quad \forall n \geq n_0.$$

Тогда в модели (6) существует эффект Ефимова, т.е. выполняется достаточное условие теоремы 3.4:

$$((U - K)\nu_n, \nu_n) = \int_{p_n}^{p_{n+1}} u(x) \nu_n^2(x) dx - \lambda_n \leq q_n - \lambda_n < 0 \quad \text{при всех } n \geq n_0.$$

Случай 3: $|\sigma_d(K)| = \infty$ и $|\sigma_d(U - K)| < \infty$. В работах [6-9] доказано, что если функция $u(x)$ — аналитическая в некоторой комплексной окрестности отрезка $[0, 1]$ и каждая критическая точка функции $u(x)$ невырождена, то для произвольного симметрического ядра $k(x, s)$, аналитического на $[0, 1]^2$ дискретный спектр оператора $U - K$ конечен. Например, в случае $u(x) = x^2$ для произвольного симметричного ядра $k(x, s)$, аналитического на $[0, 1]^2$ в модели Фридрихса отсутствует эффект Ефимова.

Список литературы

- [1] Фаддеев Л. Д. О модели Фридрихса в теории возмущений непрерывного спектра. — В. кн.: Труды МИ АН СССР, Т.73, М.: "Наука 1964, С. 292-313.
- [2] Минлос Р. А., Синай Я. Г. Исследование спектров стохастических операторов, возникающих в решетчатых моделях газа. — ТМФ, 1970, Т.2, №2, С. 230-243.

- [3] Лакаев С. Н., Минлос Р. А. О связанных состояниях кластерного оператора. – ТМФ, 1979, Т.39, С.83-92.
- [4] Friedrichs K. O. Uber die Spectralzerlegung eines Integral operators. – Math. Ann., 1938, 115, P. 249-272.
- [5] Ладыженская О. А., Фаддеев Л. Д. К теории возмущений непрерывного спектра. – ДАН СССР, 1962, Т.145, №2, С. 301-304.
- [6] Лакаев С. Н. О дискретном спектре обобщенной модели Фридрихса. – ДАН УЗССР, 1979, №4, С. 9-10.
- [7] Лакаев С.Н. Некоторые спектральные свойства обобщенной модели Фридрихса. – Труды семинара им. И. Г. Петровского, 1986, вып. 11, С. 210-238.
- [8] Имамкулов С. А., Лакаев С. Н. Дискретный спектр одномерной модели Фридрихса. – ДАН УЗССР, 1988, №7, С. 9-11.
- [9] Abdullaev J. I. Lakaev S. N. On the Spectrial Properties of the Matrix-valued Friedrichs Model. – Manyparticles Hamiltonians Spectrum and Scattering. Editor: R. A. Minlos, – Advances in Soviet Mathematics, 1991, 5.
- [10] Рид М., Саймон Б. Методы современной математической физики, Том 1: Функциональный анализ. – М.: "Мир 1977 г.
- [11] Рид М., Саймон Б. Методы современной математической физики, Том 4: Анализ операторов. – М.: "Мир 1982 г.
- [12] Ефимов В. Н. Связанные состояния трех резонансов взаимодействующих частиц. – Ядерная физика, 1970, Т.12, вып.5, С. 1080-1091.
- [13] Amado R. D., Noble J. V. Efimov's effect: a new pathology of three-particle systems, I. – Phys. Lett. B., 1971, V.35, №1, P. 25-27.
- [14] Amado R. D., Noble J. V. Efimov's effect: a new pathology of three-particle systems, II. – Phys. Rev. D. 1972, V.5, №8. P. 1992-2002.
- [15] Меркурьев С. П., Фаддеев Л. Д. Квантовая теория рассеяния для систем нескольких частиц. – М.: "Наука 1985 г.
- [16] Яфаев Д. Р. К теории дискретного спектра трехчастичного оператора Шредингера. – Мат. сборник, 1974, Т.9(136), №4(8), С. 567-592.
- [17] Ovchinnikov Yu. N., Sigal I. M. Number of bound states of three-body systems and Efimov's effect. – Ann. Physics, 1989, V.123, P. 274-295.
- [18] Tamura H. The Efimov's effect of three-body Schrödinger operators. – J. Func. Anal., 1991, V.95, P. 433-459.
- [19] Mattis D. C. The few-body problem on lattice. – Rev. Modern Phys., 1986, V.58, №2, P. 361-379.

- [20] Mogilner A. I. The problem of a few quasi-particles in SSPh. In "Application of self-adjoint extensions in quantum Physics"(P. Exner, P. Seba, eds). – Lecture Notes in Physics, V.324, Springer-Verlag-Berlin, 1988.
- [21] Лакаев С.Н. О бесконечном числе трехчастичных связанных состояний системы трех квантовых решетчатых частиц. – ТМФ, 1991, Т.89, №1, С. 94-104.
- [22] Лакаев С. Н. Об эффекте Ефимова в системе трех одинаковых квантовых частиц. – Функ. анализ и его прил., 1993, Т.27, вып. 3, С. 15-28.
- [23] Эшкабилов Ю. Х. Об одном дискретном "трехчастичном" операторе Шредингера в модели Хаббарда. – ТМФ, 2006, Т.149, №2, С. 228-243.

Сведения об авторе

Ф.И.О: Эшкабилов Юсуп Халбаевич.

Место работы: механико-математический факультет Национального Университета Узбекистана им М.Улугбека.

Адрес по месту работы: 100174, Узбекистан, г Ташкент, ВУЗгородок.

Домашний адрес: 100139, Узбекистан, г Ташкент, Чиланзар 8371-23-34-42.

Тел: 8371-246-02-30 (раб), 8371-274-67-10 (дом)

e-mail: yusup62@rambler.ru